


Trigonometria i funcions  
1<sup>r</sup> Batxillerat  
8 de març de 2024

Nom i Cognoms: \_\_\_\_\_

1. (2 punts) Fent servir el següent rectangle, deduiu que

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha) \cdot \cos(\beta) + \cos(\alpha) \cdot \sin(\beta)$$

Expliqueu clarament els passos que feu.



**Solució:**

Fet a classe.

2. (1 punt) Feu servir la fórmula de l'exercici anterior per trobar fórmules per calcular les següents quantitats. Expliqueu clarament quines propietats feu servir.

(a) (0.5 punts)  $\sin(2\alpha) =$

**Solució:**

Fet a classe.

(b) (0.5 punts)  $\sin(\alpha - \beta) =$

**Solució:**

Fet a classe.

3. (3 punts) Considereu la següent funció

$$f(x) = \frac{x^2 - 3x - 4}{x^2 - 4x}$$

- (a) (0.5 punts) Trobeu-ne el domini

**Solució:**

Només cal igualar el denominador a zero:

$$x^2 - 4x = 0 \implies x = 0 \text{ o } x = 4$$

Per tant:

$$D(f) = \mathbb{R} - \{0, 4\}$$

(b) (2 punts) Estudieu-ne la continuïtat

**Solució:**

- En  $x = 0$ . Fem el límit:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{-4}{0}$$

La funció tindrà una discontinuïtat asimptòtica en  $x = 0$ . Caldrà però fer els laterals per saber si serà  $+\infty$  o  $-\infty$ . Com el denominador és una paràbola còncaua cap amunt que talla en  $x = 0$  i  $x = 4$ , per l'esquerra de  $x = 0$  és positiva i per la dreta negativa. Per tant tindrem:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \frac{-4}{0^+} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \frac{-4}{0^-} = +\infty$$

- En  $x = 4$ . Fem el límit:

$$\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = \frac{0}{0} \text{ Indeterminació}$$

Per resoldre la indeterminació factoritzem trobant les arrels del numerador i denominador. Les del denominador ja les hem trobat abans. Les del numerador seran:

$$x^2 - 3x - 4 = 0 \implies x = 4 \text{ o } x = -1$$

Així tindrem:

$$\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x-4) \cdot (x+1)}{x \cdot (x-4)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x+1}{x} = \frac{5}{4}$$

I la funció tindrà una discontinuïtat del tipus evitable en  $x = 4$ .

(c) (0.5 punts) Calculeu  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) =$

**Solució:**

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - \cancel{3x} - \cancel{4}}{x^2 - \cancel{4x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^2} = 1$$

4. (1 punt) Feu els següents límits:

(a) (0.5 punts)

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{1}{\cos(x)}$$

**Solució:**

Notem que el  $\cos(\frac{\pi}{2}) = 0$  i passa de ser positiu a negatiu en  $x = \frac{\pi}{2}$ . Per tant el límit quedarà:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{1}{\cos(x)} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

(b) (0.5 punts)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{\sin(x)}$$

**Solució:**

Fent el límit ens trobem amb una indeterminació del tipus  $\frac{0}{0}$ . Fent servir que  $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$  la podem resoldre fàcilment:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{\sin(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin(x)}{\cos(x)}}{\sin(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cancel{\sin(x)}}{\cancel{\sin(x)} \cdot \cos(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos(x)} = 1$$

5. (1.5 punts) Els tres costats d'un triangle mesuren 3, 4 i 6 cm. Calculeu-ne els angles.

**Solució:**


Fixem-nos que el triangle no és rectangle perquè no compleix el teorema de Pitàgores:  $3^2 + 4^2 \neq 6^2$ . No obstant, podem fer servir el germà gran del teorema de Pitàgores, el teorema del cosinus. Si anomenem  $a = 3$ ,  $b = 4$  i  $c = 6$ , tindrem:

$$3^2 = 4^2 + 6^2 - 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \cos(A) \implies \cos(A) = \frac{9 - 16 - 36}{-48} \implies A = 26.38^\circ$$

$$4^2 = 3^2 + 6^2 - 2 \cdot 3 \cdot 6 \cos(B) \implies \cos(B) = \frac{16 - 9 - 36}{-36} \implies B = 36.34^\circ$$

I el tercer angle el podem trobar restant:  $C = 180 - A - B = 117.28^\circ$

6. (1.5 punts) Per mesurar l'altura d'un núvol s'han fet simultàniament dues observacions des dels punts  $A$  i  $B$  distants entre si 1 km i situats tots dos al nivell del mar. La inclinació des de la visual des de  $A$  al núvol des de la horitzontal és de  $47^\circ$ . Els angles que formen les visuals des de  $A$  i des de  $B$  amb la recta  $AB$  són, respectivament, de  $38^\circ$  i  $53^\circ$ , tal com s'indica a la figura següent.



Calculeu l'altura a la que es troba el núvol respecte el nivell del mar.

**Solució:**

Trobem primer l'angle que falta a la cara frontal:  $180 - 53 - 38 = 89$ . Ara, podem trobar l'aresta que va de  $A$  fins al núvol amb el teorema del sinus. Si li diem  $a$  ens quedarà:

$$\frac{\sin(53)}{a} = \frac{\sin(89)}{1} \implies a = \frac{\sin(53)}{\sin(89)} = 0.79km$$

L'aresta  $a$  és la hipotenusa d'un triangle rectangle amb angle agut  $47$  i un dels seus catets és l'altura a la que es troba el núvol. Per tant tindrem:

$$x = a \sin(47) = \boxed{0.58 \text{ km}}$$

El núvol es trobarà a 580 m d'altura.